

大腸癌

レジメン名称	薬剤	用量	投与日(day)	インターバル(日)
イリノテカン+Pani	ベクティビックス	6mg/kg	1	14
	イリノテカン	150mg/m ²	1	
イリノテカン単剤	イリノテカン	150mg/m ²	1	14
5FU+ LV + Pani	ベクティビックス	6mg/kg	1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	1	
	5-FU (bolus)	400mg/m ²	1	
	5-FU (infusion)	4000mg/m ²	1	
5FU+ LV + BV	アバスタチン	5mg/kg	1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	1	
	5-FU (bolus)	400mg/m ²	1	
	5-FU (infusion)	4000mg/m ²	1	
FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m ²	1	14
	イリノテカン	150mg/m ²	1	
	5-FU (bolus)	400mg/m ²	1	
	5-FU (infusion)	4000mg/m ²	1	
FOLFIRI+BV	アバスタチン	5mg/kg	1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	1	
	イリノテカン	150mg/m ²	1	
	5-FU (bolus)	400mg/m ²	1	
	5-FU (infusion)	4000mg/m ²	1	
FOLFIRI+Pani	ベクティビックス	6mg/kg	1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	1	
	イリノテカン	150mg/m ²	1	
	5-FU (bolus)	400mg/m ²	1	
	5-FU (infusion)	4000mg/m ²	1	
mFOLFOX6	レボホリナート	200mg/m ²	1	14
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1	
	5-FU (bolus)	400mg/m ²	1	
	5-FU (infusion)	4000mg/m ²	1	
mFOLFOX6+BV	アバスタチン	5mg/kg	1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1	
	5-FU (bolus)	400mg/m ²	1	
	5-FU (infusion)	4000mg/m ²	1	
mFOLFOX6+Pani	ベクティビックス	6mg/kg	1	14
	レボホリナート	200mg/m ²	1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	1	
	5-FU (bolus)	400mg/m ²	1	
	5-FU (infusion)	4000mg/m ²	1	

レジメン名称	薬剤	用量	投与日(day)	インターバル(日)
TAS102+BV	ロンサーフ	75mg/m ² /日	1~5, 8~12	28
	アバスチン	5mg/kg	1, 15	
XELOX	カペシタビン	1700mg/m ²	1~14	21
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1	
XELOX+BV	カペシタビン	2000mg/m ²	1~14	21
	アバスチン	7.5mg/kg	1	
	オキサリプラチン	130mg/m ²	1	
XELOXIRI+BV	カペシタビン	1700mg/m ² /日	1~14	21
	アバスチン	7.5mg/kg	1	
	オキサリプラチン	100mg/m ²	1	
	イリノテカン	150mg/m ²	1	